

Clef des Cochlostomatidae

1- Coquille conique évasée ≤ 8 mm, fortement côtelée à 8 tours nettement convexes ; côtes régulières et fines (6-8 par mm au niveau du dernier tour) ; couleur de grisâtre à brun-rouge pâle avec jusqu'à trois lignes spiralées formées de taches plus sombres ; péristome blanc réfléchi

.....[Cochlostome commun – Cochlostoma septemspirale](#)

1'- Coquille > 9 mm jusqu'à 15 mm à tours modérément convexes**2**

2- Ouverture orbiculaire à large péristome blanc réfléchi ; espèces endémiques pyrénéennes**3**

2'- Ouverture à péristome plus étroit ; coquille conique élancée, jaunâtre brun clair à brun foncé avec une ou deux bandes discontinues plus foncées, 7 à 9 tours ; la surface varie de presque lisse striée (ssp. *obscura* à sculptée avec côtes saillantes (10-12 / mm du dernier tour) ssp. *laburdense*)[Cochlostome montagnard – Obscurella obscura](#)

3- péristome large sans bourrelet interne ; costules serrées (12 à 17 par mm sur le dernier tour) ; coquille conique élancée à 8 tours, de 9-11 mm, de couleur gris-marron violacé avec une ou deux bandes discontinues plus foncées.[Cochlostome des éboulis – Obscurella partioti](#)

3'- péristome large avec un net bourrelet interne ; costules espacées (5-6 par mm du dernier tour) ; coquille conique évasée lie-de-vin à 8 tours, de 10-15 mm[Cochlostome cantabrique – Obscurella hidalgoi](#)

